



Steckbrief: *Galium valdepilosum* HEINR.BRAUN – Mährisches Labkraut (Rubiaceae)

Weitere Angaben aus Abfragen der Roten Listen (BfN-Prüflisten) ...

Angaben zum Artnamen *Galium valdepilosum* Heinr. Braun (Abfragezeit: 23. Oktober 2024, 13.45 Uhr):

- anerkannte Namen: *Galium valdepilosum* Heinr. Braun^[1]; *Galium valdepilosum*^[2]; *Galium valdepilosum* Heinr. Braun^[3];
- Synonym: *Galium anisophyllum* subsp. *bavaricum* Ehrend. ^[3];

Biologie und Ökologie		
Gefährdung	Verantwortung	Verbreitung in Deutschland
stark gefährdet (Metzing et al. 2018)	besonders hohe Verantwortlichkeit (Metzing et al. 2018)	BY, BW, TH, ST (Jäger 2017)
Gefährdungsursachen	Standort	Beschreibung
unbekannt	Graspioniergesellschaften, Gebüschsäume (Oberdorfer 2001) Rasen und Gebüschsäume (Jäger 2017); Kiefernwälder (Fischer et al. 2008); Trocken-, Halbtrockenrasen (Floraweb 2020)	Pflanzenhöhe (9–)15–30(–40) cm, aber Stängel niederliegend aufsteigend, oft abstehend behaart oder kahl, von unten langästig, unten meist rötlich, Blätter gerade, glänzend, Blüten 2–3,5 mm Durchmesser, weiß, in eiförmigen länglichen bis breiten pyramidalen Blütenständen, Blütenstiele 0,8–1,1 mm lang, Früchte spitz papillös (Floraweb 2020); Blätter in (6)7–8(9)-zähligen Wirteln (Jäger 2016); Verwechslungsmöglichkeit mit <i>Galium pumilum</i> , hier jedoch Stängel unten nicht rot überlaufen, Blütenstand schmal kegelförmig, meist kurzästig, locker, Frucht ± glatt (Jäger 2017; Floraweb 2020)
Lebensform	Lebensdauer	Mykorrhizierung
Hemikryptophyt, Pleiokorm (Jäger 2017)	ausdauernd (Jäger 2017)	unbekannt, wahrscheinlich arbuskuläre Mykorrhiza (Wang & Qui 2006*)
Blütezeit	Bestäubung	Kompatibilität
Juni bis Juli (Jäger 2017); (Mai) Juni bis Juli (Jäger 2016)	Insektenbestäubung, Selbstbestäubung (Floraweb 2020)	selbstinkompatibel (Samuel et al. 1990*)
Frucht und Samen	Samenzahl- und Gewicht	Samenreife und Ausbreitung
Frucht: kugelförmig, plankonvex, 1,1–1,5 × 1,1–1,3 mm, Oberfläche stumpf bis fein papillös, glanzlos, dunkelbraun (Bojnanský & Fargašová 2007); Fruchtstiele 0,5–3 mm lang (Sebald et al. 1996); Frucht mit kurzen stumpfen bis längeren, spitzlichen Papillen (Fischer et al. 2008)	unbekannt	Klett-, Wind-, Verdauungsausbreitung (Floraweb 2020)
Kultursprüche		
Wasserbedarf	pH-Spezifität	Substratspezifität
Trockenheits- bis Frischezeiger (Ellenberg et al. 1992); mäßig trocken (Oberdorfer 2001, Jäger 2017); sehr luftfeucht (Sebald et al. 1996); bodentrocken (Fischer et al. 2008)	Mässigsäure- bis Schwachbasenzeiger (Ellenberg et al. 1992); basenreich, kalkarm (Oberdorfer 2001); bodensauer, kalkmeidend (Fischer et al. 2008); basisch, sauer, Serpentin, selten kalkhaltig, pH: 4,2 (Lichtung im Eichenwald) bis 7,5 (Weide, Gestein) (Kolář et al. 2013); serpentin-besiedelnde Bestände: pH 5,5 (Kolář et al. 2014)	flachgründige, steinige Böden (Oberdorfer 2001); steinige, sandige Silikatrohböden (Jäger 2017)

Lichtbedarf	Nährstoffbedarf	Temperaturansprüche
Halblicht- bis Volllichtpflanze (Ellenberg et al. 1992); sonnig (Oberdorfer 2001); schattig (Sebald et al. 1996)	stickstoffarm (Ellenberg et al. 1992)	Mäßigwärme-, bis Wärmezeiger (Ellenberg et al. 1992); sommerwärmeliebend (Oberdorfer 2001)
Vermehrung	Keimungsansprüche	Keimungsdauer
Aussaat aus frischen, reifen Samen, Teilung der Rhizome im Frühjahr oder Herbst (Jelitto 1990*, Brickell 2000*, Cheers 2003*); vegetative Vermehrung über Ausläufer (Biolflor 2021)	Photoperiode (Tag/Nacht): 16/8 h, 25/15 °C (Puchalski et al. 2014)	3 Wochen (Kolář et al. 2014)
Schädlinge	Dormanz und Samenlebensdauer	Hybridisierung
unbekannt	keine Dormanz (Puchalski et al. 2014); unbekannt, kurzlebige Samenbank, weniger als 1 Jahr (<i>G. pumilum</i> , Thompson et al. 1997)	wahrscheinlich mit <i>G. pumilum</i> und <i>G. anisophyllum</i> (Jäger 2016)

* Angabe bezieht sich auf die Gattung

Sonstiges

einiger Fundort in BW: an einem Weißjurafelsen unmittelbar über der Karstquelle des Lauter (Sebald et al. 1996); Ploidiegrad (diploide, tetraploide Populationen) beeinflusst die Morphologie (Größe der Corolla, Fruchtlänge), verschiedene Ökotypen (auf Serpentinböden und ohne Serpentin) weisen keine morphologischen Unterschiede auf (Stepankova 1997); Diploide weisen eine geringere ökologische Nische auf als Tetraploide (Kolář et al. 2013); Diploide sind zarter, keinblütiger, finden sich in der Fränkischen Alb, Tetraploide sind kräftiger, großblütiger und finden sich im südostlichen Bayern und Schwäbischen Alb bis Mitteldeutschland, Tetraploide Populationen wurden in Dänemark als eigene Unterart (*G. valdepilosum* subsp. *slesvicense* Ehrendorff 1975) geführt (Jäger 2016)


Abbildung



Herbarbeleg von *Galium valdepilosum*

(Quelle: Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin)

Verbreitungskarte Deutschland



(Quelle: NetPhyD, BfN 2013)

Zitiervorschlag: Weißbach S., Lauterbach D., Plank A. (2024) Steckbrief *Galium valdepilosum*; erstellt am 11.01.2022, zuletzt bearbeitet 24.10.2024. – Netzwerk zum Schutz gefährdeter Wildpflanzen in besonderer Verantwortung Deutschlands (WIPs-De), <http://www.wildpflanzenschutz.de/>, https://wiki.bgbm.org/wips-daten/index.php/Galium_valdepilosum.

Literatur

- Biolflor (2021) Klotz, S., Kühn, I. & Durka, W. [Hrsg.] (2002): BIOLFLOR - Eine Datenbank zu biologisch-ökologischen Merkmalen der Gefäßpflanzen in Deutschland. - Schriftenreihe für Vegetationskunde 38. Bonn: Bundesamt für Naturschutz. https://www.ufz.de/biolflor/taxonomie/taxonomie.jsp?ID_Taxonomie=1329. Zugriff am 11.06.2021.
- Bojnansky V., Fargašová A. (2007) Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora - The Carpathian Mountains Region. Springer Netherlands, 1046 S.
- Brickell C. (2000) DuMont's Große Pflanzen-Enzyklopädie. The Royal Horticultural Society, DuMont Buchverlag, Köln, 3. Auflage, 1096 S.
- Cheers G. (2003) Botanica. Das Abc der Pflanzen. 10.000 Arten in Text und Bild. Ullmann/Tandem, Potsdam, 1019 S.
- Ehrendorfer F. (1975) Further taxonomic notes on Rubiaceae in Europe. Plant Systematics and Evolution 124:173-178.
- Ellenberg H., Weber H. E., Düll R., Wirth V., Werner W., Paulissen D. (1992) Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica 18: 1-258. 2. überarbeitete Auflage.
- Fischer M. A., Oswald K., Adler W. (2008) Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmessen, Linz, 3. Auflage, 1392 S.
- Floraweb (2020) FloraWeb – Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. <http://www.floraweb.de/>. Zugriff am 11.09.2020.
- Jäger E. J. (Hrsg.) (2016) Gustav Hegi Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band VI, Teil 2B, 2. Auflage. Weissdorn-Verlag, Jena, 348 S.
- Jäger E. J. (Hrsg.) (2017) Rothmaler Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. 21. Aufl. Spektrum, Heidelberg, Berlin, 924 S.
- Jelitto L. (1990) Die Freiland-Schmuckstauden. Handbuch und Lexikon der winterharten Gartenstauden. 4. Aufl. Ulmer, Stuttgart.
- Kolář F., Lučanová M., Vít P., Urfus T., Chrtěk J., Féř T., Ehrendorfer F., Suda, J. (2013) Diversity and endemism in deglaciated areas: ploidy, relative genome size and niche differentiation in the *Galium pusillum* complex (Rubiaceae) in Northern and Central Europe. Annals of Botany 111: 1095-1108.
- Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Drotová M., Knotek A., Suda J. (2014) Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of *Galium valdepilosum* in central Europe. Preslia 86: 155-178.
- Metzing D., Hofbauer N., Ludwig G., Matzke-Hajek G. (2018) Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 7: Pflanzen. Münster (Landwirtschaftsverlag). – Natur- schutz und Biologische Vielfalt 70 (7): 784 S.
- Netzwerk Phytodiversität Deutschlands e.V. (NetPhyD) und Bundesamt für Naturschutz (BfN) (Hrsg.) (2013) Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Landwirtschaftsverlag, Münster.
- Oberdorfer E. (2001) Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. 8. Auflage. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1051 S.
- Puchalski J., Niemczyk M., Walerowski P., Podyma W., Kapler, A. (2014) Seed banking of Polish endangered plants – the FlorNatur Project, Biodiversity Research and Conservation 34: 65-72.
- Samuel R., Pinsker W., Ehrendorfer F. (1990) Allozyme polymorphism in diploid and polyploid populations of *Galium*. Heredity 65: 369-378.
- Sebald O., Seybold S., Philippi G., Wörz A. (1996) Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Band 5: Spezieller Teil (Spermatophyta, Unterklasse Asteridae) Buddlejaceae bis Caprifoliaceae. Eugen Ulmer GmbH & Co, Stuttgart, 539 S.
- Stepankova J. (1997) The effect of serpentine on morphological variation in the *Galium pumilum* group (Rubiaceae). Thaiszia 7: 29-40.
- Thompson K., Bakker J. P., Bekker, R. M. (1997) The Soil Seed Banks of North West Europe: Methodology, density and Longevity. Cambridge University Press, Cambridge, 276 S.
- Wang B., Qiu Y. L. (2006) Phylogenetic distribution and evolution of mycorrhizas in land plants. Mycorrhiza, 16: 299-363.
-
- Quellenangaben der BfN-Prüflisten/Rote Listen
1. Metzing, D.; Garve, E.; Matzke-Hajek, G.; Adler, J.; Bleeker, W.; Breunig, T.; Caspary, S.; Dunkel, F.G.; Fritsch, R.; Gottschlich, G.; Gregor, T.; Hand, R.; Hauck, M.; Korsch, H.; Meierott, L.; Meyer, N.; Renker, C.; Romahn, K.; Schulz, D.; Täuber, T.; Uhlemann, I.; Welk, E.; Weyer, K. van de; Wörz, A.; Zahlheimer, W.; Zehm, A. & Zimmermann, F. (2018): Rote Liste und Gesamtartenliste der Farn- und Blütenpflanzen (Tracheophyta) Deutschlands. – In: Metzing, D.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 7: Pflanzen. – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (7): 13-358. (Datenquellen: checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/43; taxon/35202 – für das Gebiet Deutschland)
 2. BfN (2020): Rekonstruierte Checkliste zu Korneck, D.; Schnittler, M. & Vollmer, I. (1996): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) Deutschlands. – In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. – Bonn (Bundesamt für Naturschutz). – Schriftenreihe für Vegetationskunde 28: 21-187. (Datenquellen: checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/251; taxon/314212 – für das Gebiet Deutschland)
 3. Buttler, K. P.; May, R. & Metzing D. (2018): Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. – BfN-Skripten 519, 286 S. (Datenquellen: checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/355; taxon/555678 – für das Gebiet Deutschland)

Erarbeitet im Rahmen des Projektes „WIPs-De – Aufbau eines nationalen Verbundes zum Schutz gefährdeter Wildpflanzenarten in besonderer Verantwortung Deutschlands“.



Bundesamt für
Naturschutz



Gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Abgerufen von „https://wiki.bgbm.org/wips-daten/index.php?title=Galium_valdepilosum&oldid=2809“ (Donnerstag, den 24.10.2024)