



Steckbrief: *Phyteuma nigrum* F. W. SCHMIDT – Schwarze Teufelskralle (Campanulaceae)

Weitere Angaben aus Abfragen der Roten Listen (BfN-Prüflisten) ...

Angaben zum Artnamen *Phyteuma nigrum* F. W. Schmidt (Abfragezeit: 28. Oktober 2024, 09.48 Uhr):

- anerkannte Namen: *Phyteuma nigrum* F. W. Schmidt^[1]; *Phyteuma nigrum*^[2]; *Phyteuma nigrum* F. W. Schmidt^[3];
- Synonyme: (derzeit ohne Eintragungen)

Biologie und Ökologie		
Gefährdung	Verantwortung	Verbreitung in Deutschland
Vorwarnliste (Metzing et al. 2018)	besonders hohe Verantwortlichkeit (Metzing et al. 2018)	RP, SL, HE, SN, BY, BW, NW, TH, ST, NI, HB, BE, BB (Jäger 2017)
Gefährdungsursachen	Standort	Beschreibung
Bodenversauerung, Bodenvernässung (Boerrigter 1995); Eutrophierung und Zuwachsen von Waldsäumen, Düngung und Übernutzung von Magerwiesen (WIPs-De)	Bergwiesen, Laubmischwälder (Oberdorfer 1990, Jäger 2017); ausgehagerte Grabenkanten, Bach-, Wegränder, Gehölzwälle (Feder 2012)	Pflanzenhöhe 20–60 cm, Spreite der Grundblätter etwa doppelt so lang wie breit, mit meist nur seicht herzförmigen Grund, untere Stängelblätter am Grund verschmälert, die mittleren und oberen mit reduzierter Spreite, Blütenstand eiförmig bis walzig, Hüllblätter lineal lanzettlich, Blüten vor dem Aufblühen deutlich gekrümmmt, Krone schwarzviolett oder schwarzblau (sehr selten weiß), Narben 2, Pleiokorm, Rübe (Floraweb 2021); Verwechslungsmöglichkeit mit <i>Phyteuma ovatum</i> , diese jedoch südlicheres subalpinen Verbreitungsgebiet, Grundblattspreite 1–1,5 mal so lang wie breit (Jäger 2017); Verwechslungsmöglichkeit im vegetativen Zustand mit <i>P. spicata</i> (Feder 2012)
Lebensform	Lebensdauer	Mykorrhizierung
Hemikryptophyt (Jäger 2017)	ausdauernd (Jäger 2017)	unbekannt
Blütezeit	Bestäubung	Kompatibilität
Mai bis Juli (Jäger 2017); Mai bis Juni (Kwak et al. 1991)	Insektenbestäubung (Oberdorfer 1990, Jäger 2017); Vormännlichkeit, Selbstbestäubung? (Jäger 2017); Schmalbienen <i>Lasioglossum malachurum</i> , <i>L. morio</i> (Westrich 2018); Wiesenhummel <i>Bombus pratorum</i> , Heidehummel <i>B. jonellus</i> , Ackerhummel <i>B. pascuorum</i> (Kwak et al. 1991); Schmalbiene <i>Lasioglossum albipes</i> , Furchenbiene <i>Halictus tumulorum</i> (Baumann et al. 2021); Schwebfliege <i>Rhingia campestris</i> (Hoffmann 2005)	selbstinkompatibel (Boerrigter 1995)
Frucht und Samen	Samenzahl- und Gewicht	Samenreife und Ausbreitung
längliche Kapsel, sich mit seitlichen Poren öffnend, kleine ovale Samen (Sebald et al. 1996*); Kapsel halbkugelig bis fast kugelig, etwa 5 mm lang, dünnhäutig, nahe dem Grund mit 3 oder 2 Poren öffnend, Samen ellipsoidisch, etwas abgeflacht, 0,8–1,0 mm lang und 0,4–0,5 mm breit, braun (Wagenitz 2008)	Tausendkorngewicht 0,1 g (RBG KEW 2021); 0,15 g (WIPs-De)	Stoß-, Schüttel-, Menschenausbreitung (Jäger 2017); mitunter über Grassaat verschleppt, tlw. in Parks eingebürgert (Wagenitz 2008)

Kultursprüche		
Wasserbedarf	pH-Spezifität	Substratspezifität
frisch (Oberdorfer 1990); Frischezeiger (Ellenberg et al. 1992)	(neutral) mäßig sauer, basenreich, kalkarm (Oberdorfer 1990); Mäßig säurezeiger (Ellenberg et al. 1992); kalkmeidend (Jäger 2017)	humose Lehmböden, Mull- Moderböden (Oberdorfer 1990)
Lichtbedarf	Nährstoffbedarf	Temperaturansprüche
Licht-Halbschattenpflanze (Oberdorfer 1990); Halblichtpflanze (Ellenberg et al. 1992)	mäßig nährstoffreich (Oberdorfer 1990); Stickstoffarmut bis mäßigen Stickstoffreichtum zeigend (Ellenberg et al. 1992)	Kühle- bis Mäßigwärmezeiger (Ellenberg et al. 1992)
Vermehrung	Keimungsansprüche	Keimungsdauer
Generativ (siehe Keimungsansprüche) und vegetativ (Hoffmann 2005)	Photoperiode (Tag/Nacht): 14/10 h, 18/10 °C, Keimrate 100 %, Zugabe von GA3 (250 mg/l) beim Ansatz, Lichtkeimer (WIPs-De)	t'50-Wert: 14 Tage (WIPs-De)
Schädlinge	Dormanz und Samenlebensdauer	Hybridisierung
unbekannt	Dormanz unbekannt; Samenbank kurzlebig, weniger als 1 Jahr (Thompson et al. 1997)	<i>P. nigrum × P. spicatum</i> (Weeda 1989)

t'50-Wert: Anzahl an Tagen, nach denen die Hälfte der Gesamtkeimrate erreicht wurde; * Angabe bezieht sich auf die Gattung

Sonstiges

bis 50 cm tief wurzelnder Lehmzeiger (Oberdorfer 1990); Population braucht mindestens 20 blühende Individuen, damit sie bestehen kann und sich selbst verjüngt (Boerrigter 1995); angesiedelte Pflanzen sind empfindlich, wenn sie vorher im Gewächshaus angezogen worden sind; Michaelis & Diekmann (2018) haben nach 2 Jahren keine überlebenden Individuen mehr auf ihren Ansiedlungsflächen gefunden; Empfehlung für Pflegemaßnahmen: auf feuchten Wiesen mit saurem Untergrund 2schürige Mahd, wenig düngen, *P. nigrum* ist schnittempfindlich bis mäßig schnittverträglich, verträgt 1–2 Schnitte pro Jahr (Sebald et al. 1996); in der Pfalz tritt *P. nigrum* lokal in Massen in durchforsteten Esskastanienwäldern auf, wo sie sich nach Bodenstörung ausbreitet; *P. nigrum* lässt sich durch Einsaat besser etablieren (WIPs-De)

Abbildungen



Blüte von *Phyteuma nigrum*


(Foto: Botanischer Garten der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, A. Schönhöfer)



Same von *Phyteuma nigrum*

(Foto: Botanischer Garten der Universität Osnabrück, S. Oevermann)

Verbreitungskarte Deutschland



(Quelle: NetPhyD, BfN 2013)

Zitiervorschlag: Weißbach S., Heinken-Šmídová A., Lang J., Lauterbach D., Oevermann S., Schönhöfer A., Tschöpe O., Plank A. (2024) Steckbrief *Phyteuma nigrum* erstellt am 16.02.2022, zuletzt bearbeitet 28.10.2024. – Netzwerk zum Schutz gefährdeter Wildpflanzen in besonderer Verantwortung Deutschlands (WIPs-De), <http://www.wildpflanzenschutz.de/>, https://wiki.bgbm.org/wips-daten/index.php/Phyteuma_nigrum.


Literatur

- Baumann K., Keune J., Wolters V., Jauker F. (2021) Distribution and pollination services of wild bees and hoverflies along an altitudinal gradient in mountain hay meadows. *Ecology and evolution* 11: 11345–11351.
- Boerrigter E. J. M. (1995) On the perspectives of populations of the rare plant species *Phyteuma nigrum* (Doctoral dissertation, Verlag nicht ermittelbar). <https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/14463203/Phyteuma.pdf>. Zugriff am 12.11.2021.
- Ellenberg H., Weber H. E., Düll R., Wirth V., Werner W., Paulissen D. (1992) Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. *Scripta Geobotanica* 18: 1–258. 2. überarbeitete Auflage.
- Feder J. (2012) Die Schwarze Teufelskralle *Phyteuma nigrum*. F. W. SCHMIDT im Land Bremen. Bremer Botanische Briefe 15: 5–10.
- Floraweb (2021) FloraWeb – Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. <http://www.floraweb.de/>. Zugriff am 12.11.2021.
- Hoffmann F. (2005) Biodiversity and pollination: Flowering plants and flower-visiting insects in agricultural and semi-natural landscapes.s.n. <https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/2892448/c6.pdf>, Zugriff am 03.12.2021.
- Jäger E. J. (Hrsg.) (2017) Rothmaler Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. 21. Aufl. Spektrum, Heidelberg, Berlin, 924 S.
- Kwak M. M., Kremer P., Boerrichter E., van den Brand C. (1991) Pollination of the rare species *Phyteuma nigrum* (Campanulaceae): Flight distances of bumblebees. *Proceedings of Experimental and Applied Entomology* 2: 131–136.
- Metzing D., Hofbauer N., Ludwig G., Matzke-Hajek G. (2018) Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 7: Pflanzen. Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (7): 784 S.
- Michaelis J., Diekmann M. (2018) Effects of soil types and bacteria inoculum on the cultivation and reintroduction success of rare plant species. *Plant ecology* 219: 441–453.
- NetPhyD – Netzwerk Phytodiversität Deutschlands e.V. (NetPhyD) und Bundesamt für Naturschutz (BfN) (Hrgs.) (2013) Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Landwirtschaftsverlag, Münster.
- Oberdorfer E. (1990) Pflanzensoziologische Exkursionsflora.
6. überarbeitete u. erg. Auflage, Stuttgart, Eugen Ulmer GmbH & Co, 1050 S.
- RBG Kew, Wakehurst Place (2021) Seed Information Database: Search Results (kew.org). Zugriff am 15.11.2021.
- Sebald O., Seybold S., Philipp G., Wörz A. (Hrsg.) (1996) Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Band 5: Spezieller Teil (Spermatophyta, Unterklasse Asteridae) Buddlejaceae bis Caprifoliaceae. Eugen Ulmer GmbH & Co, Stuttgart, 539 S.
- Thompson K., Bakker J. P., Bekker, R. M. (1997) The Soil Seed Banks of North West Europe: Methodology, density and Longevity. Cambridge University Press, Cambridge, 276 S.
- Wagenitz (Hrsg.) (2008) Gustav Hegi Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band VI – Teil 2A Spermatophyta: Angiospermae: dicotyledones 4 (2/1) 2. Auflage., Weissdorn-Verlag, Jena.
- Westrich P. (2018) Die Wildbienen Deutschlands. Stuttgart, Eugen Ulmer Verlag, 824 S.
- Weeda E. J. (1989) *Phyteuma nigrum* FW Schmidt en *P. spicatum* L. in Nederland. *Gorteria* 15: 6–27.
- WIPs-DE Beobachtungen aus dem Projekt Wildpflanzenschutz Deutschland, Projektlaufzeit 2018–2023.

Quellenangaben der BfN-Prüflisten/Rote Listen

1. Metzing, D.; Garve, E.; Matzke-Hajek, G.; Adler, J.; Bleeker, W.; Breunig, T.; Caspari, S.; Dunkel, F.G.; Fritsch, R.; Gottschlich, G.; Gregor, T.; Hand, R.; Hauck, M.; Korsch, H.; Meierott, L.; Meyer, N.; Renker, C.; Romahn, K.; Schulz, D.; Täuber, T.; Uhlemann, I.; Welk, E.; Weyer, K. van de; Wörz, A.; Zahlheimer, W.; Zehm, A. & Zimmermann, F. (2018): Rote Liste und Gesamartenliste der Farn- und Blütenpflanzen (Tracheophyta) Deutschlands. – In: Metzing, D.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 7: Pflanzen. – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (7): 13–358. (Datenquellen: checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/43; taxon/36748 – für das Gebiet Deutschland)
2. BfN (2020): Rekonstruierte Checkliste zu Korneck, D.; Schnittler, M. & Vollmer, I. (1996): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) Deutschlands. – In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. – Bonn (Bundesamt für Naturschutz). – Schriftenreihe für Vegetationskunde 28: 21–187. (Datenquellen: checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/251; taxon/315190 – für das Gebiet Deutschland)
3. Buttler, K. P.; May, R. & Metzing D. (2018): Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. - BfN-Skripten 519, 286 S. (Datenquellen: checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/355; taxon/556386 – für das Gebiet Deutschland)

Erarbeitet im Rahmen des Projektes „WIPs-De – Aufbau eines nationalen Verbundes zum Schutz gefährdeter Wildpflanzenarten in besonderer Verantwortung Deutschlands“.



Bundesamt für
Naturschutz



WIPs
de
BOTANISCHER GARTEN
www.botanischer-garten-potsdam.de



Gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.

Abgerufen von „https://wiki.bgbm.org/wips-daten/index.php?title=Phyteuma_nigrum&oldid=2873“ (Montag, den 28.10.2024)