



## Steckbrief: *Rhynchospora alba* (L.) VAHL – Weißes Schnabelried (Cyperaceae)

Weitere Angaben aus Abfragen der Roten Listen (BfN-Prüflisten) ...

Angaben zum Artnamen *Rhynchospora alba* (L.) Vahl (Abfragezeit: 28. Oktober 2024, 12.08 Uhr):

- anerkannte Namen: *Rhynchospora alba* (L.) Vahl<sup>[1]</sup>; *Rhynchospora alba*<sup>[2]</sup>; *Rhynchospora alba* (L.) Vahl<sup>[3]</sup>;
- Synonym: Bas.: *Schoenus albus* L. <sup>[3]</sup>;

### Biologie und Ökologie

Gefährdung	Verantwortung	Verbreitung in Deutschland
gefährdet (Metzing et al. 2018)	allgemeine Verantwortlichkeit (Metzing et al. 2018)	BY, BW, Ns, NRW, MV, SH, TH, Rh, Sa, An, BB, HE (Müller et al. 2021)
Gefährdungsursachen	Standort	Beschreibung
Absenkung des Grundwasserspiegels, Kultivierung, Entwässerung und Aufforstung von Moorstandorten (FloraWeb 2022); Drainage, Nährstoffeintrag, Beweidung (Rybniček 1970)	Hoch- und Zwischenmoorschlenken, nasse, zeitweilig überflutete Ränder verlandeter Moorgewässer, feuchte Zwergstrauchheiden, nasse Torfstiche, lichte Moorwälder (Müller et al. 2021)	Pflanze ohne oder nur mit kurzen Ausläufern, Ährchenknäuel etwa so lang wie sein Tragblatt, Ährchen anfangs schneeweiss, später etwas rötlich, Pflanzenhöhe 0,15–0,4 m (Müller et al. 2021)
Lebensform	Lebensdauer	Mykorrhizierung
Geophyt (Müller et al. 2021)	ausdauernd (Müller et al. 2021)	unbekannt
Blütezeit	Bestäubung	Kompatibilität
Juli-August (Müller et al. 2021)	windbestäubt (BiolFlor 2022)	selbstkompatibel* (BiolFlor 2022)
Frucht und Samen	Samenzahl- und Gewicht	Samenreife und Ausbreitung
Frucht: 1,5–2,2 mm lang, 0,9–1,4 mm breit, 0,4–0,8 mm dick (BiolFlor 2022)	Samenzahl unbekannt; Samengewicht 0,29–1,1 mg (Egawa et al. 2009); Tausendkorngewicht 0,496 g (Mazer 1989); 0,401 - 0,456 g (RBG Kew, Wakhurst Place 2016)	Samenreife Mitte August bis Mitte Oktober, Jungpflanzen blühen und fruchten auch später; Frucht mit Borsten zur Klett-ausbreitung (WIPs-De); Ausbreitung durch Wasser und Tiere (Maas & Poschlod 1991); vegetative Ausbreitung durch Brutzwiebeln (WIPs-De)

### Kulturansprüche

Wasserbedarf	pH-Spezifität	Substratspezifität
nass (Maas & Poschlod 1991); staunass (Oberdorfer 1990)	leicht sauer, große Spanne um pH 5 (Rybniček 1970)	Torf mit hohen Anteil an organischem Material, sandige Substrate mit dünnem Humus-Horizont (Rybniček 1970); grober Weißtorf (WIPs-De)
Lichtbedarf	Nährstoffbedarf	Temperaturansprüche
Halblicht- Volllichtpflanze (FloraWeb 2022)	mäßig nährstoffreich (Oberdorfer 1990); niedriger Mg <sub>2+</sub> , Ca <sub>2+</sub> -Gehalt (10 mg/l) (Rybniček 1970)	Mäßigwärmezeiger (FloraWeb 2022)
Vermehrung	Keimungsansprüche	Keimungsdauer
Samen, sehr gute vegetative Vermehrung durch Entnahme der Brutzwiebeln ab Spätherbst (WIPs-De)	Samen vor Aussaat wässern und feuchte Aufbewahrung für 4 Wochen bei 3 °C (Roem et al. 2002); 50 % Keimungsrate nach Kältebehandlung, weniger als 20 % ohne Kältebehandlung (Egawa et al. 2009)	Aussaat im Februar auf nassem Torf im Freiland, Keimung ab Mitte Mai (WIPs-De); 2 Wochen (Roem et al. 2002)
Schädlinge	Dormanz und Samenlebensdauer	Hybridisierung
unbekannt	Dormanz unbekannt; kurzzeitige Samenbank (Egawa et al. 2009)	unbekannt

\* Angabe bezieht sich auf die Gattung


### Sonstiges

Sämlinge hatten größte Biomasse auf nacktem Boden, Biomasse nahm mit zunehmender Beschattung ab (Egawa & Tsuyuzaki 2011); Förderung durch Stickstoffeintrag (Lütt 2021)

## Abbildung



## Verbreitungskarte Deutschland



(Quelle: BfN 2013)

Zitativorschlag: Lauterbach D., Weißbach S., Borgmann P., Daumann J., Kuppinger A.-L., Listl D., Martens A., Nick P., Oevermann S., Poschlod P., Radkowitsch A., Reisch C., Stevens A.-D., Straubinger C., Zachgo S., Zippel E., Burkart M., Plank A. (2024) Steckbrief *Rhynchospora alba*; erstellt 2016, zuletzt bearbeitet 28.10.2024. – Netzwerk zum Schutz gefährdeter Wildpflanzen in besonderer Verantwortung Deutschlands (WIPs-De), <http://www.wildpflanzenschutz.de/>, [https://wiki.bgbm.org/wips-daten/index.php/Rhynchospora\\_alba](https://wiki.bgbm.org/wips-daten/index.php/Rhynchospora_alba).

## Literatur

- BiolFlor (2022) BiolFlor, Datenbank biologisch-ökologischer Merkmale der Flora von Deutschland. <http://www2.ufz.de/BiolFlor/index.jsp>. Zugriff Dezember 2022.
- Egawa, C., Koyama, A., Tsuyuzaki, S. (2009) Relationships between the developments of seedbank, standing vegetation and litter in a post-mined peatland. *Plant Ecology* 203: 217–228.
- Egawa, C., Tsuyuzaki, S. (2011) Seedling establishment of late colonizer is facilitated by seedling and overstory of early colonizer in a post-mined peatland. *Plant Ecology* 212: 369–381.
- FloraWeb (2022) FloraWeb – Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. <http://www.floraweb.de/>. Zugriff Novmeber 2022.
- Lütt S. (2021) 30 Jahre Vegetationsentwicklung schleswig-holsteinischer Moore – Untersuchungen an Dauerbeobachtungsflächen. *Natur und Landschaft* 96: 570–578.
- Maas, D., Poschlod, P. (1991) Restoration of exploited peat areas in raised bogs—technical management and vegetation development. In Ravera, O. (Ed.): *Terrestrial and aquatic ecosystems. Perturbation and recovery*. Chichester, S. 379–386.
- Mazer, S. (1989) Ecological, taxonomic, and life history correlates of seed mass among Indiana dunes Angiosperms. Supplement: species list, untransformed seed mass, seed mass class and ecological data associated with each species. *Ecological Monographs* 59: 153–175.
- Metzing D., Hofbauer N., Ludwig G., Matzke-Hajek G. (2018) Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 7: Pflanzen. Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (7): 784 S.
- Müller F., Ritz C. M., Welk E., Wesche K. (Hrsg.) (2021) Rothmaler Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. 22. Aufl. Spektrum, Heidelberg, Berlin, 959 S.
- Oberdorfer, E. (1990) *Pflanzensoziologische Exkursionsflora*. Ulmer, Stuttgart, 1050 S.
- RBG Kew, Wakhurst Place (2016): Seed Information Database, <http://data.kew.org/sid/SidServlet?ID=19755&Num=iRA> (Zugriff 03.02.2016).
- Roem, W. J., Klees, H., Berendse, F. (2002) Effects of nutrient addition and acidification on plant species diversity and seed germination in heathland. *Journal of Applied Ecology* 39: 937–948.
- Rybniček, K. (1970) *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, its distribution, communities and habitat conditions in Czechoslovakia, Part 2. *Folia Geobotanica et Phytotaxonomica* 5: 221–263.
- WIPs-De Beobachtungen aus dem Projekt Wildpflanzenschutz Deutschland, Projektlaufzeit 2018–2023.

## Quellenangaben der BfN-Prüflisten/Rote Listen

- Metzing, D.; Garve, E.; Matzke-Hajek, G.; Adler, J.; Bleeker, W.; Breunig, T.; Caspari, S.; Dunkel, F.G.; Fritsch, R.; Gottschlich, G.; Gregor, T.; Hand, R.; Hauck, M.; Korsch, H.; Meierott, L.; Meyer, N.; Renker, C.; Romahn, K.; Schulz, D.; Täuber, T.; Uhlemann, I.; Welk, E.; Weyer, K. van de; Wörz, A.; Zahlheimer, W.; Zehm, A. & Zimmermann, F. (2018): Rote Liste und Gesamtartenliste der Farn- und Blütenpflanzen (Tracheophyta) Deutschlands. – In: Metzing, D.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 7: Pflanzen. – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (7): 13–358. (Datenquellen: [checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/43; taxon/34585](http://checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/43; taxon/34585) – für das Gebiet Deutschland)
- BfN (2020): Rekonstruierte Checkliste zu Korneck, D.; Schnittler, M. & Vollmer, I. (1996): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) Deutschlands. – In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. – Bonn (Bundesamt für Naturschutz). – Schriftenreihe für Vegetationskunde 28: 21–187. (Datenquellen: [checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/251; taxon/315577](http://checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/251; taxon/315577) – für das Gebiet Deutschland)
- Buttler, K. P.; May, R. & Metzing D. (2018): Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. - BfN-Skripten 519, 286 S. (Datenquellen: [checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/355; taxon/556577](http://checklisten.rotelistezentrum.de/api/public/1/checklist/355; taxon/556577) – für das Gebiet Deutschland)

Erarbeitet im Rahmen des Projektes „WIPs-De – Aufbau eines nationalen Verbundes zum Schutz gefährdeter Wildpflanzenarten in besonderer Verantwortung Deutschlands“.



Bundesamt für  
Naturschutz



Gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

Abgerufen von „[https://wiki.bgbm.org/wips-daten/index.php?title=Rhynchospora\\_alba&oldid=2918](https://wiki.bgbm.org/wips-daten/index.php?title=Rhynchospora_alba&oldid=2918)“ (Montag, den 28.10.2024)